

DER ER I ØJEBLIKKET

SKARLAGENSFEBER I KLASSEN

SMITTE:

Skarlagensfeber skyldes smitte med bakterier (streptokokker).

Smitten spredes gennem luften.

Smitten sker bl.a. fra raske smittebærere, det er derfor vigtigt ikke at benytte samme spiseredskaber, drikke af samme glas osv.

Inkubationstiden er fra 1 – 3 døgn.

SYMPTOMER:

Sygdommen starter ofte med halsbetændelse.

Symptomerne er feber, synkesmerter, hævede og ømme lymfekirtler på halsen samt påvirket almentilstand.

Efter et par dage ses udslæt som knappenålestøre røde pletter, der ofte sidder så tæt, at huden får et ensartet ”skarlagensrødt” udseende.

Udslættet starter på maven og breder sig over hele kroppen. Ansigtet kan være blussende og tungen rød.

Uden behandling svinder udslættet efter en uge. Efter 1 – 2 uger kan huden skalle af på hænder og fødder.

BEHANDLING:

Skarlagensfeber behandles med penicillin. Barnet er smittefrit efter 2 dages behandling.

Barnet må komme i skole efter 2 dages penicillinbehandling, hvis barnet er symptomfrit og kan følge de daglige aktiviteter.

